

มะค่าแต้



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Sindora siamensis* Teijsm. & Miq.

ชื่อพื้นเมือง หมักแต้, มะค่าแต้ (นครราชสีมา); กรอกก๊อ (เขมร – พระตะบอง); ก่อเก๊ะ, ก้าเกะ (เขมร – สุรินทร์); กอกก้อ (ชาวบน – นครราชสีมา); แต้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะค่าแต้ (ทั่วไป); มะค่าหนาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); มะค่าหุ้ม (ภาคเหนือ)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น มะค่าแต้เป็นไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 เมตร ผลัดใบ ลำต้นค่อนข้างเปลาตรง แตกกิ่งต่ำ เปลือกนอกสีเทาคล้ำ

ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 3 – 4 คู่ รูปวงรีกว้างหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน ออกตรงข้ามกัน

ดอก ดอกช่อ ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกสีเหลืองแดง ออกดอกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ผล ผลเป็นฝักแบน รูปไข่ สีเขียว ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอด ผิวฝักด้านนอกเรียบหรือมีหนามแหลม ฝักแก่สีน้ำตาลแตกอ้าออกจากกัน แต่ละฝักมี 1 – 3 เมล็ด ออกผลเดือนมิถุนายน – กันยายน

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ต้องการความชุ่มชื้นปานกลาง

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร เมล็ดอ่อน รับประทานสด เมล็ดแก่คั่วแล้วกะเทาะเปลือก รับประทานได้คล้ายเมล็ดมะขาม

รส หวาน มัน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด