

สารภีดอกใหญ่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Mammea harmandii* Kosterm.

ชื่อพื้นเมือง สารภี (นครราชสีมา, บุรีรัมย์); สารภีจิง (เพชรบูรณ์);

สารภีดอกใหญ่ (ระนอง)

ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น สารภีดอกใหญ่เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงถึง 15

เมตร เปลือกนอกสีน้ำตาล แตกเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ใบแก่สีเขียวเข้ม แผ่นใบหนา

ดอก ดอกออกเป็นช่อ หรือเป็นกระจุก ตามลำต้น กิ่งก้าน กลีบดอกสีขาวขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม

ผล ผลรูปกระสวย ผิวผลเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง หนึ่งผลมี 1 เมล็ด สีน้ำตาล ออกผลเดือนเมษายน – มิถุนายน

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด และดินร่วนซุย ขึ้นได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนสิงหาคม - กันยายน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้

รส หวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง