



सानใบเล็ก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dillenia ovata* Wall. ex Hook.f. & Thomson
 ชื่อพื้นเมือง ส้มกลีบ (นครราชสีมา); ไข่เน่าคง, ตานกกด (เลย); ปล้อง
 (ส่วย – สุรินทร์); มะโตน (ชลบุรี); ส้านกวาง (ภาคใต้);
 ส้านโดยเด (นครพนม); ส้านใบเล็ก (ปัตตานี); แส้น (ตรัง)
 ชื่อวงศ์ DILLENIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ส้านใบเล็กเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร ลำต้นมัก
 เป็นปุ่มปม กิ่งอ่อนมีขน เรือนยอดเป็นพุ่มกลมสีเขียวเข้ม ทึบ ปลายกิ่ง
 ห้อยลง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน
 เนื้อใบหนา ท้องใบมีขนนุ่ม สีจางกว่าหลังใบ

ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว ขนาดใหญ่ ตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองสด ออก
 ดอกเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

ผล ผลสด ลูกกลมแป้น ภายในผลเป็นเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ด ฉ่ำน้ำ เนื้อผลหนา สี
 เหลือง ออกผลเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้ หรือนำมาปรุงรสอาหาร
 รสเปรี้ยว

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด