

เถาคันแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

ชื่อสามัญ True Virginia creeper

ชื่อพื้นเมือง เครือหุนแป, เถาคันขาว, เถาคันแดง (ภาคกลาง)

ชื่อวงศ์ VITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เถาคันแดงเป็นไม้เถาเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีเขียว เถาแก่สีน้ำตาล ผิวขรุขระ มีมือพันแตกออกจากข้อ ใช้เกาะต้นไม้อื่น

ใบ ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 – 5 ใบ ใบเรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่กลับ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบเรียบ

ดอก ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ออกดอกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ผล ผลทรงกลม สีเขียว เมื่อสุกสีดำ ออกผลเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรังและป่าคันทาสภาพ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นในดินไม่อุ้มน้ำ

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ลวก ต้ม จิมน้ำพริกหรือรับประทานเป็นผักสด รส มัน จืด

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด