


เร่ว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amomum villosum* Lour. var.

xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu & S.Chen

ชื่อสามัญ Bastard cardamom, Tavoy cardamom

ชื่อพื้นเมือง หมากแห้ง (นครราชสีมา, สระบุรี); ผาลา (เงี้ยว – เชียงใหม่);
มะหมากอี, มะอี, หมากอี (เชียงใหม่); เร่ว (ภาคกลาง);
หมากเน้ง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เร่วเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นกาบของใบที่เรียง
หุ้มซ้อนกัน

ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน เรียงสลับระนาบเดียว

ดอก ดอกออกเป็นช่อที่เหง้า แทงขึ้นมาเหนือผิวดิน ออกดอกเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน

ผล ผลออกเป็นกระจุก ทรงกลม ผิวเป็นขนเหมือนหนามสีแดง เมล็ดสีน้ำตาล
มีเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ ออกผลเดือนกรกฎาคม – กันยายน

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร และมักพบในที่ร่ม ชอบดินร่วน
ซุย ความชื้นสูง

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร หน่ออ่อน ผลอ่อน รับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก เมล็ด
ใช้เป็นเครื่องเทศปรุงรส ใส่ก๋วยเตี๋ยว ต้มพะโล้

รส เผ็ด

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ดและแยกเหง้า