

งูคอขี้นหัวดำ งูสาบหญ้าคอดำ- *Sibynophis collaris* (Gray, 1853)

Common collared snake

ลักษณะ งูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูท่อน 530 มิลลิเมตร และหางยาว 182 มิลลิเมตร) หัวยาวและส่วนของหัวกว้างใกล้เคียงกับลำคอ ตาค่อนข้างใหญ่ ลำตัวกลม หางเรียวและยาว ส่วนปลายของหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง แผ่นเกล็ดมีสันเล็กและขอบด้านนอกมีรอยหยักเล็ก เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 176 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 116 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวสีน้ำตาลแดง บนหัวมีแถบกว้างสีดำพาดขวาง 2 แถบ แถบแรกอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง และแถบที่สองอยู่ทางด้านท้ายของหัว ตรงท้ายทอยมีแถบสีดำขอบท้ายเป็นจุดประสีขาว ขอบปากบนสีขาว บนหลังทางครึ่งหน้าของลำตัวสีน้ำตาลแดงเหมือนสีบนหัว แต่ครึ่งท้ายของลำตัวและหางเป็นสีน้ำตาลดำ บนหลังในแนวกลางตัวมีจุดสีขาวกับจุดสีดำสลับกันเรียงตัวเป็นแถวยาวตลอดความยาวลำตัวจนถึงปลายหาง คอ ใต้คาง ด้านท้อง และใต้หางสีขาว

การแพร่กระจาย จีน เนปาล อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย พื้นล่างของป่า

นิสัย ออกหากินเวลากลางวันบนพื้นล่างของป่า และค่อนข้างจำกัดแหล่งอาศัยในพื้นที่ป่าค่อนข้างชุ่มชื้น

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชมีประชากรน้อย