



งูคอขวันหัวลายสามเหลี่ยม งูسابหญ้าแดง
Sibynophis triangularis Taylor and Elbel, 1958
Triangle collared snake

งูคอขวั้นหัวลายสามเหลี่ยม งูสาบหญ้าแดง

Sibynophis triangularis Taylor and Elbel, 1958

ลักษณะ งูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 360 มิลลิเมตร และหางยาว 194 มิลลิเมตร) หัวยาวและส่วนของหัวกว้างใกล้เคียงกับลำคอ ตาใหญ่ ลำตัวกลม หางเรียวและยาว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง แผ่นเกล็ดมีสันเล็กและขอบด้านนอกมีรอยหยักเล็ก เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 160-189 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 113-124 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวสีเทา บนหัวมีแถบกว้างสีดำพาดขวาง 2 แถบ แถบแรกอยู่ในตำแหน่งทางด้านท้ายของตา และแถบที่สองอยู่ทางด้านท้ายของหัว ส่วนต้นของลำคอมีปื้นใหญ่รูปสามเหลี่ยมหัวกลับสีดำขอบด้านท้ายสีขาวพาดขวาง ด้านข้างของหัวมีแถบสีดำจากส่วนปลายของปากผ่านตาแล้วต่อไปทางด้านท้ายของตาไปที่มุมของฐานรูปสามเหลี่ยมบนลำคอ ขอบปากบนสีขาวและพาดยาวไปทางด้านข้างลำคอไปเชื่อมต่อกับเส้นสีขาวที่เป็นขอบด้านท้ายของปื้นสีดำรูปสามเหลี่ยม บนหลังทางครึ่งหน้าของลำตัวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเหลือง แต่ครึ่งท้ายของลำตัวและหางเป็นสีเทาเหมือนกับสีบนหัว บนหลังในแนวกลางตัวมีจุดสีขาวกับจุดสีดำสลับกันเรียงตัวเป็นแถวยาวตลอดความยาวลำตัวจนถึงปลายหาง ด้านข้างลำตัวมีจุดเล็กสีน้ำตาลเหลืองเรียงตัวเป็นแถวยาวตลอดความยาวลำตัวจนถึงปลายหาง คอ ใต้คาง ด้านท้อง และใต้หางสีขาว ขอบด้านบนของเกล็ดท้องและเกล็ดใต้หางมีจุดสีดำ

การแพร่กระจาย กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย ป่าล่างของป่า

นิสัย ออกหากินเวลากลางวันบนพื้นล่างของป่า และค่อนข้างจำกัดแหล่งอาศัยในพื้นที่ป่าค่อนข้างชุ่มชื้น มีขนาดตัวเล็กและมีสีลำตัวกลมกลืนกับสีของใบไม้และสีพื้นดินจึงสังเกตได้ยาก

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชมีประชากรน้อย