

งูดินโคราช – *Typhlops khoratensis* Taylor, 1962

ลักษณะ ขนาดเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 100 – 125 มิลลิเมตร และหางยาว 2 – 3 มิลลิเมตร – จาก Taylor 1963) ลำตัวเรียวยาวและกลม ส่วนของหัวกว้างเท่ากับลำตัว ส่วนปลายของหัวมน หางสั้นมาก และส่วนปลายของหางมีหนามแข็ง ตาเล็กมากและมองเห็นเป็นจุดทึบแสง ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดขนาดเล็กปกคลุม เกล็ดรอบลำตัวในแนวกึ่งกลางตัวจำนวน 20 เกล็ด (Taylor, 1963)

ลำตัวสีเทา ด้านท้องสีจางกว่าด้านหลังเล็กน้อย ส่วนปลายของหัว ช่องเปิดรูก้น และหาง มีสีจางกว่าสีลำตัว (Taylor, 1963)

การแพร่กระจาย พบเฉพาะประเทศไทยในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย พื้นล่างของป่าบริเวณที่ดินร่วนซุยและมีความชุ่มชื้น

นิสัย ไม่มีข้อมูล

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชไม่มีข้อมูลปริมาณประชากร