



งูปล้องหวายหัวดำ

Calliophis maculiceps (Gunther, 1858)

Speckled coral snake

รูปล้องหวายหัวดำ – *Calliophis maculiceps* (Gunther, 1858)

ลักษณะ รูปร่างตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 308-318 มิลลิเมตร และหางยาว 33 มิลลิเมตร) หัวยาวและส่วนของหัวเท่ากับลำคอ ตาเล็ก ลำตัวกลมและเรียวยาว หางสั้นและค่อนข้างใหญ่ ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 13 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 198 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 30 เกล็ด

เอกสารหลายเล่มระบุว่า มีลำตัวสีน้ำตาลแดงหรือสีส้ม และมีลวดลายบนลำตัวเป็นจุดเล็กสีดำหรือเป็นปื้นใหญ่สีดำหรือเป็นเส้นเล็กและหยักสีดำ แต่ที่พบในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชมีด้านบนของหัวและลำคอสีดำ ด้านข้างของหัวตั้งแต่ด้านท้ายตาถึงลำคอสีเทา บนหลังและด้านบนของหางสีเขียวอมเทา บางตัวมีจุดเล็กสีดำเรียงตัวเป็นแถวยาวที่ด้านข้างลำตัวตลอดความยาวลำตัวจนถึงโคนหาง ด้านบนของหางมีจุดกลมใหญ่สีดำ 2 จุด แต่บางตัวไม่มีจุดเล็กสีดำที่ด้านข้างลำตัวนอกจากจุดสีดำ 2 จุดบนหาง ด้านท้องและใต้หางสีส้มอมแดง

การแพร่กระจาย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง ในป่าเต็งรัง และกลุ่มไม้บริเวณอาคารของสถานีวิจัยฯ

พื้นที่อาศัย ตามพื้นล่างของป่าและของกลุ่มไม้บริเวณอาคาร

นิสัย ออกหากินเวลากลางคืนบนพื้นล่างของป่า และค่อนข้างจำกัดแหล่งอาศัยในพื้นที่ป่า เมื่อถูกรบกวนจะขดส่วนท้ายของลำตัวและหางเป็นวงและพลิกด้านท้องที่เป็นสีส้มอมแดงขึ้นมา ซึ่งเป็นพฤติกรรมคล้ายคลึงกับของงูปีแก้วในสกุล *Oligodon*

สถานภาพ **สถานภาพ** ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สำหรับสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ เป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคามตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) แต่ไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง