



งูลายสาบเขียวขวันดำ
Rhabdophis nigrocinctus (Blyth, 1855)
Green keelback

งูลายสาบเขียวขี้วันดำ – *Rhabdophis nigrocinctus* (Blyth, 1855)

ลักษณะ งูขนาดตัวปานกลาง (จากปลายปากถึงรูก้น 645 มิลลิเมตร และหางยาว 159 มิลลิเมตร) หัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ตาใหญ่ ลำตัวสั้น หางค่อนข้างยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีสัน เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 19 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 159 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 88 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวสีเขียวอมน้ำตาล ด้านข้างของหัวมีแถบสีดำจากด้านล่างของตาลงไปที่ขอบปากบน และมีแถบสีดำจากด้านท้ายตาลงไปที่มุมขากรรไกร ส่วนต้นของลำตัว (1/3 ของความยาวลำตัว) สีเขียวอมน้ำตาล และส่วนท้ายของลำตัว (2/3 ของความยาวลำตัว) สีน้ำตาลแดง ใต้คางและคอสีขาว ด้านท้องสีขาวแต่ทางส่วนท้ายเป็นสีขาวขุ่นหรือสีเทา ใต้หางสีเทาอมดำแต่ขอบด้านนอกสีขาว งูวัยอ่อนมีสีลำตัวแตกต่างจากของตัวเต็มวัยเล็กน้อย คือ งูวัยอ่อนมีหัวสีน้ำตาล ด้านท้ายทอยสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านหลังสีเขียว และมีขีดสีดำพาดขวางลำตัวเป็นระยะตลอดความยาวลำตัว ส่วนงูวัยรุ่นมีหัวสีน้ำตาล ส่วนต้นของลำตัวสีเขียวอมน้ำตาล ส่วนท้ายของลำตัวสีน้ำตาล และมีขีดสีดำพาดขวางเป็นระยะซึ่งเป็นที่ชัดเจนทางส่วนต้นของลำตัว

การแพร่กระจาย จีน เวียดนาม ลาว เวียดนาม กัมพูชา ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช พบบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ

พื้นที่อาศัย ใกล้เคียงน้ำ

นิสัย หากินอยู่บนพื้นดินในพื้นที่ใกล้เคียงน้ำและกินสัตว์น้ำ (กบ เขียด) หากินเวลากลางวันและหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มพรรณพืชใกล้เคียงน้ำ

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง