



งูปล้องฉนวนสร้อยเหลือง งูสร้อยเหลือง

Lycodon capucinus Boie, 1827

Common wolf snake

รูปปล้องจนวนสร้อยเหลือง ูสร้อยเหลือง – *Lycodon capucinus* Boie, 1827

ลักษณะ ูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 338-435 มิลลิเมตร และหางยาว 47-113 มิลลิเมตร) หัวแบนและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ส่วนปลายของหัวมน ตาเล็ก ลำตัวกลมและยาว หางยาวและส่วนปลายของหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางเล็กและมีพื้นผิวเรียบและเป็นมัน เกล็ดท้องขยายกว้างและขอบด้านนอกของแผ่นเกล็ดมีสัน เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 17 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 188-205 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 61-71 เกล็ด

ลำตัวมีด้านบนของหัวสีน้ำตาลอมม่วงเข้ม มีแถบกว้างสีน้ำตาลเหลืองพาดขวางที่ท้ายทอย แผ่นเกล็ดในแถบสีเหลืองมีจุดสีน้ำตาลกระจาย ขอบปากบนสีเหลืองและมีจุดสีน้ำตาลอมม่วงเรียงตัวเป็นแถว บนหลังและทางด้านบนของหางสีน้ำตาลอมม่วงแต่มีขีดสีเหลืองเป็นโครงข่ายร่างแหที่ไม่เป็นระเบียบ (เนื่องจากแผ่นเกล็ดสีน้ำตาลอมม่วงมีขอบเป็นสีเหลืองกับสีของผิวหนังระหว่างแผ่นเกล็ด)

การแพร่กระจาย จีน อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เกาะมัลดีฟ หมู่เกาะแมสคารีน ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และกลุ่มไม้บริเวณอาคารของสถานีวิจัยฯ

พื้นที่อาศัย พื้นล่างของป่า

นิสัย เวลากลางวันหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ขอนไม้หรือใต้กองใบไม้บนพื้นล่างของป่าที่มีความชุ่มชื้น และออกหากินเวลากลางคืน มีนิสัยค่อนข้างดุและฉกกัด เมื่อถูกรบกวนจะฉก

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบได้บ่อยครั้ง