



สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช



สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

งูเขียวปากแหลม – *Ahaetulla nasuta* (Lacepede, 1789)

Long nosed whip snake

งูเขียวปากแหนบ – *Ahaetulla nasuta* (Lacepede, 1789)

ลักษณะ งูขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูท่อน้ำ 640 มิลลิเมตร และหางยาว 358 มิลลิเมตร จาก Taylor, 1963) หัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอ ส่วนปลายของหัวเรียวและมีรอยค้ำยื่นออกไปจากส่วนปลายของหัว (rostral scale) ตาใหญ่ ลำตัวเรียวและยาว หางเรียวและยาวแต่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและใช้ยึดพันกิ่งไม้ไม่ได้ ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางรูปร่างยาวและพื้นผิวเรียบ แผ่นเกล็ดเรียงตัวในแนวเฉียงไปทางด้านบน เกล็ดด้านท้องขยายกว้างและมีสัน ขอบด้านบนของแผ่นเกล็ดมีรอยหยัก เกล็ดใต้หางเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 15 เกล็ด เกล็ดท้องจำนวน 193 เกล็ด และเกล็ดใต้หางจำนวน 155 เกล็ด (Taylor, 1963)

ลำตัวสีเขียว ด้านท้องและใต้หางสีจางกว่าบนหลัง บางตัวอาจมีหางสีแดง ด้านล่างของลำตัวตรงรอยต่อกับเกล็ดท้องมีเส้นยาวสีขาวตลอดความยาวลำตัว คางและใต้คอสีขาวอมฟ้าและมีจุดสีเหลืองจางกระจาย เมื่อมีพฤติกรรมข่มขู่ ทางส่วนต้นของลำตัวจะมีเส้นสีขาวกับสีดำเรียงตัวเป็นแนวเฉียงพาดขวาง ซึ่งเป็นสีของผิวหนังระหว่างแผ่นเกล็ดกับของขอบแผ่นเกล็ดลักษณะเดียวกับของงูเขียวหัวจิ้งจก

การแพร่กระจาย อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง

พื้นที่อาศัย บริเวณที่มีกลุ่มไม้กระจาย

นิสัย ไม่มีข้อมูล แต่คาดหมายว่าเหมือนกับงูเขียวหัวจิ้งจก

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามเกณฑ์ของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบได้น้อยครั้ง