

จิ้งเหลนเรียวขาเล็ก – *Lygosoma quadrupes* (Linnaeus, 1766)

ลักษณะ มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 59 – 68 มิลลิเมตร และหางยาว 68 – 72 มิลลิเมตร) ลำตัวเรียวยาว หัวยาวและแบนราบเล็กน้อยและส่วนหัวกว้างใกล้เคียงกับลำคอ ส่วนปลายของหัวมน หางยาวและยาวใกล้เคียงหรือมากกว่าความยาวลำตัว ขาหน้าและขาหลังเล็กและสั้นมาก ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมและแผ่นเกล็ดมีพื้นผิวมัน เกล็ดบนหัว บนหลัง หาง และด้านท้องมีขนาดเล็ก เกล็ดรอบลำตัวในตำแหน่งกึ่งกลางตัวจำนวน 26 เกล็ด

ลำตัวด้านหลังสีน้ำตาลดำ แผ่นเกล็ดมีขอบสีดำทำให้มีลักษณะคล้ายเส้นสีดำพาดยาวอยู่บนลำตัวจากปลายหัวถึงปลายหาง 8 เส้น ด้านท้องสีขาวและมีเส้นสีดำจางตามความยาวหลายเส้น

ขาหน้าและขาหลังเล็กและสั้นมาก โดยขาหน้ายาวเป็นสัดส่วน 1/11 ของความยาวระหว่างด้านท้ายของขาหน้ากับด้านหน้าของขาหลัง (axilla-to-groin)

การแพร่กระจาย จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ทางตอนล่างของภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย ในดินที่ร่วนซุย หรือใต้ขอนไม้ที่ผุพัง หรือใต้กองใบไม้ที่เปื่อยยุ่ย

นิสัย อาศัยอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณที่เนื้อดินค่อนข้างร่วนซุยและมีอินทรีย์สารค่อนข้างมาก หรือบนพื้นล่างของป่าดิบแล้งบริเวณที่มีซากใบไม้ค่อนข้างเปื่อยยุ่ยและเป็นชั้นค่อนข้างหนา เมื่อถูกรบกวนจะไม่ใช้ขาในการวิ่งหลบหนีแต่จะเลื้อยหลบหนีในลักษณะการเลื้อยของงู มีพฤติกรรมปล่อยหางหลุดจากลำตัว

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามกฎหมายของ IUCN (2008) ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราชไม่สามารถระบุประชากรได้ชัดเจนเนื่องจากนิสัยการดำรงชีวิตอยู่ใน