

ตุ๊กแกบินลายสามแถบ – *Ptychozoon trinitaterra* Brown, 1999

ลักษณะ มีขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูก้น 70.5 – 71.3 มิลลิเมตร และหางยาว 17.8 มิลลิเมตร) ลำตัวค่อนข้างแบนราบ หัวยาวและส่วนหัวกว้างกว่าลำคอ หางยาว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดอ่อนนุ่มปกคลุม เกล็ดทางส่วนหน้าของหัวใหญ่และใหญ่เป็นสองเท่าของเกล็ดบนหลังและบนหาง เกล็ดบนหลังรูปร่างกลมหรือเป็นรูปหลายเหลี่ยมและไม่ซ้อนเหลื่อมกัน เกล็ดด้านท้องใหญ่กว่าเกล็ดบนหลังและมีรูปร่างกลม แผ่นเกล็ดซ้อนเหลื่อมกัน เกล็ดใต้คางเล็ก เกล็ดใต้หางแบนและรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยม ด้านข้างของหัวมีแผ่นหนังแผ่ออกมา ด้านข้างลำตัวจากด้านท้ายของขาหน้าไปถึงส่วนต้นของขาหลังมีแผ่นหนังแผ่ออกมา และทางด้านหน้าของขาหน้ากับทางด้านท้ายของขาหลังมีแผ่นหนังแผ่ออกมา ขอบด้านข้างของหางที่แผ่นหนังแผ่ออกมาและมีลักษณะเป็นรอยหยักจำนวน 15 คู่ (Brown, 1999)

ลำตัวสีเทา มีเส้นสีเข้มรูปร่างหยักหรือรูปร่างคล้ายตัวเอ็มภาษาอังกฤษพาดขวางบริเวณท้ายทอย 1 เส้น บนหลัง 3 เส้น และทางด้านท้ายของขาหลัง 1 เส้น หางมีทางสีเข้มและจางพาดขวางเป็นปล้อง ด้านท้องและด้านในของขาสีครีมและมีจุดสีเข้มกระจาย ใต้หางมีทางสีเข้มและจางที่เป็นลายละเอียดพาดขวางเป็นปล้อง (Brown, 1999)

ขาหน้าและขาหลังสั้นแต่ใหญ่ นิ้วตีนใหญ่ นิ้วตีนด้านในสุดของขาหน้าและขาหลังไม่มีเล็บ ส่วนนิ้วอื่นทุกนิ้วมีเล็บ นิ้วตีนหน้าและนิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังระหว่างนิ้วประมาณ $3/4 - 4/5$ ของความยาวของนิ้ว (Brown, 1999)

การแพร่กระจาย เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบเฉพาะป่าดิบแล้งในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกกราช

พื้นที่อาศัย Brown (1999) ระบุว่า ได้ตัวอย่างบริเวณแนวเขตรอบนอกของป่าดิบแล้งที่อยู่ต่อเนื่องกับพื้นที่เปิดโล่ง พบบนต้นไม้ใหญ่ในระดับความสูงจากพื้นดิน 3 เมตร พื้นที่บริเวณนี้มีอุณหภูมิต่อน้ำสูง ความชื้นต่ำ มีแสงส่องลงถึงพื้นล่างของป่าค่อนข้างมาก และมีกระแสดมค่อนข้างแรง

นิสัย ไม่มีข้อมูล

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามกฎหมายของ IUCN (2008)