

คางคาวขอบหูดำ

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 9-10 ซม. ลำแขนช่วงปลายยาว 5.4-5.9 ซม. น้ำหนัก 20-38 กรัม เป็นคางคาวกินผลไม้ขนาดเล็กที่มีขนละเอียดนุ่มกว่าคางคาวขอบหูขาว สีขนโดยทั่วไปของลำตัวและหัวจะเป็นสีเทา ลำตัวด้านบนมีสีเทาเข้ม ด้านท้องและหน้าอกมีสีเทาจางกว่า ลักษณะเด่นของคางคาวชนิดนี้ คือ มีใบหูสั้นป้อมกว่าคางคาวขอบหูขาว ที่ขอบใบหูไม่มีขนและมีสีดำเห็นชัดเจน ที่สำคัญอีกอย่างคือ ไม่มีกระดูกหางเหมือนคางคาวชนิดอื่น
- เขตแพร่กระจาย :** ไทย มาเลเซีย เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว ในประเทศไทยพบทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** พบในป่าดิบแล้ง เช่น บริเวณเขื่อนรอบขอบอ่าง หลบซ่อนเกาะห้อยอยู่ตามซอกหิน เฟิงหินในป่ารกทึบ
- อุปนิสัย :** คางคาวขอบหูดำมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกินกลุ่มละ 10 ตัว กินผลไม้สุกที่มีผิวบาง เช่น หว่า ไทร และมะหวด ฯลฯ
- สถานภาพ:** มีจำนวนน้อยมาก พบปะปนมาครั้งละ 2-3 ตัว กับคางคาวขอบหูขาวกลางในจำนวน 15-20 ตัว



ค้างคาวขอบหูดำ

Tailless Fruit Bat

Megaerops ecaudatus (Temminck, 1837)

Pteropodidae

Chiroptera