

เพียงพอนเหลือง

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 27–30 ซม. หางยาว 13.5–15 ซม. น้ำหนัก 0.5–2 กิโลกรัม รูปร่างเพรียวยาว ขาสั้น ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอมเหลือง ด้านท้องสีจางกว่า ในฤดูร้อนสีขนจะเข้มขึ้น ขนบริเวณคอมีสีขาว หรือน้ำตาลแดง ตัวเมียมีเต้านม 4 คู่ และมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้
- เขตแพร่กระจาย :** ไซบีเรีย จีน เนปาล ภูฐาน อินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ในถิ่นอาศัยที่หลากหลาย ทั้งในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ระดับความสูง 1,500–5,000 ม. และบางครั้งพบเข้ามาอาศัยและหากินบริเวณพื้นที่ เกษตรกรรม ใกล้ชุมชน ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** ออกล่าเหยื่อทั้งเวลากลางคืน และเวลาพลบค่ำ ล่าเหยื่อขนาดเล็ก เช่น หนู กระรอก กินเป็นอาหาร รวมทั้งขโมยเปิดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ด้วย เวลาส่วนใหญ่หลบซ่อนอยู่ในโพรงไถดิน ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ระยะตั้งท้องประมาณ 1–1.5 เดือน ตกไข่ครั้งละ 4–10 ตัว
- สถานภาพ :** พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เพียงพอนเหลือง

(ชื่ออื่น : เพียงพอนไซบีเรีย)

Siberian Weasel

Mustela sibirica (Pallas, 1773)

Mustelidae

Carnivora