

อีเห็นหน้าขาว

ลักษณะ : คอ กว้าง ๕๕-๖๕ ซม. หาง ๕๕-๖๕ ซม. น้ำหนัก ๓-๕ กิโลกรัม
ขนอ่อนนุ่ม ฟู ขนลัด ขนสั้น ขนยาว ขนสั้น ขนยาว ขนสั้น
ลึกลับ สด กว้าง ขนสั้น ขนยาว ขนสั้น ขนยาว ขนสั้น
ขนสั้น ขนยาว ขนสั้น ขนยาว

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา
ไทย กัวเตมาลา เม็กซิโก

ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบดง
ป่าสะแก ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบดง
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : ออกหากินในเวลากลางคืน กินผลไม้ นก ไข่ นก รัง
ไข่ นก ไข่ นก รัง ไข่ นก รัง ไข่ นก รัง ไข่ นก รัง ไข่ นก รัง ไข่
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบดง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง
ป่าดิบเขา ป่าดิบดง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบดง
ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบดง

สถานภาพ : ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง



อีเห็นหน้าขาว

(อีเห็น : อีเห็นดำ)

Masked Palm Civet

Paguma larvata (Linnaeus 1757)