

## นกคักกุลา

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 23 ซม. กระหม่อม ห้ายทอย ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแดง มีลายขีดสีน้ำตาลเข้มทั่วทั้งตัว จะงอยปากยาวกว่านกคักคูอื่น ๆ มีคิ้วขาวเห็นเด่นชัด ใต้คิ้วมีแถบคาดตาสีน้ำตาลแดง คอและลำตัวด้านล่างทั้งหมดสีขาว มีลายขีดเล็กละเอียดทั่วตัว ปลายหางสีขาว เวลาเกาะต้นไม้มักเกาะตัวตั้งตรง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่ารุ่น จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1500 ม. ในป่าสะแกราชพบทั้งบริเวณป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบหากินโดดเดี่ยว เกาะตามกิ่งก้านของไม้ใหญ่ที่มีใบค่อนข้างแน่นทึบ ทำให้เห็นตัวได้ยาก จะส่งเสียงร้องเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ ร้องช่วงเช้าตรู่และเย็นค่ำ อาหารได้แก่ แมลง และหนอนแมลง
- การผสมพันธุ์ เป็นนกปรอด ไม่สร้างรังเอง จะไปวางไข่ในรังของนกอื่น เช่น นกขมิ้นน้อย นกปรอด และนกกินแมลงขนาดเล็ก ฤดูผสมพันธุ์ขึ้นอยู่กับฤดูผสมพันธุ์ของนกดังกล่าว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ไข่มีลักษณะสีส้ม สัมพันธ์กับลักษณะสีส้มของนกเจ้าของรัง เมื่อวางไข่แล้ว ปล่อยให้นกเจ้าของรังฟัก และเลี้ยงดูลูกอ่อนแทน โดยไม่สนใจไข่และลูกอ่อนอีกเลย
- สถานภาพ :** เป็นนกเฉพาะถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือชนิดย่อย *sonneratii* ซึ่งพบได้ทั่วไป
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกคักกูลาย

**Banded Bay Cuckoo, Indian Bay-banded Cuckoo**

*Cacomantis sonneratii* (Latham, 1790)

Cuculidae

Cuculiformes