

## นกเค้าเหยี่ยว

- ลักษณะ :** ลำตัวใหญ่มีความยาว 30 ซม. รูปร่างคล้ายเหยี่ยว ปีกกว้างและมน ใบหน้าเล็ก หัวกลม ตาสีทองแกมเหลือง ออก และท้องมีลายจุดใหญ่สีน้ำตาล หัว และด้านบนลำตัวมีสีน้ำตาลเข้ม มีแถบขาวเล็ก ๆ เหนือโคนปาก ใต้หางมีลายบั้งสีน้ำตาลเข้มสลับสีน้ำตาลอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีนด้านตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ เกาะไหหลำ ได้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดา เกาะสุลาเวสี และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งในป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่ารุ่น พุ่มไผ่ และบริเวณกสิกรรม จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1200 ม. นอกจากนี้ยังพบได้ในป่าชายเลน ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** พบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกหากินช่วงเช้าตรู่ เย็นค่ำ และกลางคืน ในเวลากลางวันมักเกาะตามกิ่งไม้หรือพุ่มไม้ที่มีใบแน่นทึบ เมื่อมีสิ่งรบกวนจะบินหนีไปต้นอื่น นกเค้าเหยี่ยวบินได้ดี กระกระพือปีกสลับร่อน เวลาบินลงเกาะกิ่งไม้มีลักษณะท่าทางคล้ายเหยี่ยว กินแมลงขนาดใหญ่ เช่น ค้างคาว แข็ง ตั๊กแตน นอกจากนี้ยังกิน กบ กิ้งก่า นกขนาดเล็ก หนู และค้างคาวขนาดเล็ก โดยใช้กรงเล็บจับเหยื่อกลางอากาศ แล้วนำกลับมากินบนต้นไม้หรือต่อไม้ที่เกาะเป็นประจำ
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำรังในโพรงไม้ ไม่มีวัสดุรองรับ วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาว รูปร่างค่อนข้างกลม ทั้งพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 24 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพเข้ามาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ในป่าสะแกราช พบไม่บ่อย ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Ninox scutulata burmanica*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเค้าเหยี่ยว

**Brown Hawk-Owl**

*Ninox scutulata* (Raffles, 1822)

Strigidae

Strigiformes