

## นกตบยุงหางยาว

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 30 ซม. หางยาว ปีกแคบและยาว ปากกว้าง แต่จะงอยปากสั้น ขาเล็กและไม่แข็งแรง เดินได้ไม่คึกคัก สีโดยทั่วไปเป็นสีน้ำตาลแกมเทา กระหม่อมสีจางแต่มีลายขีดสีเข้มกลางกระหม่อม ใต้คอสีขาว หัวไหล่มีลายสีดำ เมื่อกางปีกออกขณะบินเห็นแถบขาวที่ปีก และบริเวณปลายหางมีแถบขาว 2 แถบด้านนอก ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้ แต่แถบขาวที่ปีกและปลายหางไม่ชัดเจนเท่าตัวผู้
- เขตแพร่กระจาย :** พบในป่ากึ่งสถาน อินเดียน จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ ไทหล่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และออสเตรเลียตอนเหนือ
- ที่อยู่อาศัย :** นกตบยุงหางยาว มีการแพร่กระจายมากที่สุดในจำนวนนกตบยุง 6 ชนิดของประเทศไทย พบทั้งในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งโล่ง สามารถพบได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะชอบที่แห้งแล้ง พบบริเวณพื้นราบ จนถึงระดับความสูง 2,000 ม. ในพื้นที่ป่าสะแกราชพบได้ทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกหากินเวลากลางคืน กินแมลงเป็นอาหาร ได้แก่ผีเสื้อกลางคืน ตัวงูปีกแข็ง และแมลงกลางคืนอื่น ๆ หาอาหารโดยหมอบตามพื้นดินหรือเกาะกิ่งไม้แห้ง เมื่อแมลงบินผ่านมากก็บินโฉบจับด้วยปาก ส่วนเวลากลางวันมักหมอบพักบนต้นไม้หรือหมอบนอนหลับตามพื้นดิน ได้ร่วมเงาต้นไม้หรือพุ่มหญ้า ซึ่งมีใบไม้หรือใบหญ้าที่ร่วงหล่นค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากมันมีสีกลมกลืนกับสีใบไม้ใบหญ้าและพื้นดิน จึงมักมองไม่ค่อยเห็นตัว เวลานอนพักกลางคืน มันจะส่งเสียงร้องติดต่อกัน “จิ้ง จิ้ง จิ้ง”
- ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม นกตบยุงจะไม่สร้างรัง แต่จะวางไข่บนพื้นดิน ในรังมักพบไข่ 2 ฟอง ไข่สีครีมแกมเหลือง หรือสีเนื้อแกมชมพู มีลายจุดเป็นลายดอกดวงสีเทาหรือเทาแกมแดง ทั้งพ่อแม่ช่วยกันฟักไข่ระยะฟักไข่ 16 – 20 วัน
- สถานภาพ :** นกตบยุงหางยาวเป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยและปริมาณปานกลางทั่วทุกภาค และพบบ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



**นกตบยุงหางยาว**

**Large-tailed Nightjar**

*Caprimulgus macrurus* (Horsfield, 1821)

Caprimulgidae

Caprimulgiformes