

นกแอ่นตาล

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 13 ซม. ขนสีน้ำตาลเข้มทั้งตัว รูปร่างเพรียว ปีกแหลม เรียว หางยาวเรียว ต่างจากนกแอ่นกินรัง (Swiftlet) ตรงที่มันมีหางเรียวกว่า และ ว่างลึกกว่า
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งโล่ง ทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่าละเมาะ ป่าโปร่ง และบริเวณที่ใกล้กับบ้านเรือน ตั้งแต่มหาสมุทรจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราชพบทั่วไปบริเวณที่โล่ง ป่าโปร่ง
- อุปนิสัย :** ปกติพบเป็นฝูงในเวลากลางวัน ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบินและร่อน ทั้งในระดับสูง และระดับค่อนข้างสูงจากพื้นดิน บินโฉบจับกินแมลงขนาดเล็กกลางอากาศ เวลากลางวันจะเกาะนอนตามแหล่งอาศัย จะไม่เกาะสายไฟฟ้า สายโทรเลข หรือกิ่งก้านของต้นไม้ ยกเว้นใบตาลหรือใบปาล์ม
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ทำรังรวมกันเป็นกลุ่มตามใบตาล ใบมะพร้าว และใบปาล์ม รังเป็นรูปตะกร้า ด้านข้างติดกับใบตาลหรือใบปาล์ม สร้างรังด้วยวัสดุจำพวกดอกหญ้า ซึ่งมีมากช่วงฤดูผสมพันธุ์ และใช้สิ่งสกปรกออกมาจากต่อมน้ำลายเชื่อมยึดให้ติดกันแน่นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักไข่และตัวมันได้ วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง ไข่มีสีขาว ทั้งพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่ ระยะฟักไข่ 10-11 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกแอ่นตาล

Asian Palm Swift, Palm Swift

Cypsiurus balasiensis (Gray, 1829)

Apodidae

Apodiformes