

นกกะเต็นอกขาว

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ตัวยาวประมาณ 28 ซม. ตัวป้อม หัวโต คอและหางสั้น ปากยาวใหญ่ สีแดงสด ปลายปากแหลม ขนด้านหลังและขนปีกสีฟ้าสด หัว คอ ไหล่ โคนปีกและท้องสีน้ำตาลแดง ตัดกับคอและอกสีขาว ขาและเท้าสีแดงสด นกทั้ง 2 เพศ มีลักษณะเหมือนกัน
- เขตแพร่กระจาย :** ตะวันออกกลาง อินเดีย จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ ใต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะอันดามัน
- ที่อยู่อาศัย :** ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น พื้นที่เกษตรกรรม และที่โล่ง
- อุปนิสัย :** มักเกาะนิ่งๆ อยู่ตามกิ่งไม้โล่งๆ ตอไม้ สายไฟ ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อมองหาเหยื่อ เมื่อพบแล้วสามารถบินไปจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว แล้วจะนำกลับมากินยังที่เดิม บินได้ตรงรวดเร็ว และแข็งแรง ชอบส่งเสียงร้องในขณะที่บิน อาหารได้แก่แมลง สัตว์น้ำ และสัตว์เลื้อยคลานเล็ก ๆ ทำรังในช่วงฤดูร้อน โดยการขุดรูอยู่ตามริมตลิ่งที่สูงชัน มันจะต้องรีบสร้างรังให้เสร็จก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง ทำให้มันไม่สามารถสร้างรังได้ บางครั้งมันจึงสร้างรังอยู่ตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 4 – 6 ฟอง
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่นที่พบได้บ่อย ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อยนัก ได้ยินเสียงร้องและพบบ้างตามริมลำธาร

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกะเต็นอกขาว

(ชื่ออื่น : นกกินปลา นกกะเต็น นกฟังกะปากแดง)

White-throated Kingfisher

Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758)

Alcedinidae

Coraciiformes