

## นกกระจ่างหัวขวาน

- ลักษณะ :** ขนาด 31 ซม. ปากยาวเรียวสีดำโค้งลงเล็กน้อย มีลักษณะหลายอย่างที่ดูเด่น สามารถแยกออกจากนกชนิดอื่นได้ทันที คือ มีสีขนเป็นลายทางสีดำสลับชมพูอ่อน มองดูคล้ายสีของม้าลาย ที่เด่นที่สุดก็คือหงอนซึ่งเป็นขนยาว ๆ สีน้ำตาลแดง ปลายขนสีดำ ปกติขนหงอนนี้จะเอนราบไปบนหัว แต่เวลาตื่นเด่นจะคลี่ออกคล้ายพัด ขนด้านหลังสีครีม ปีกกว้างกลม บินได้ไม่ดีนัก บินช้าและบินช่วงสั้น ๆ ลักษณะการบินคล้ายลูกคลื่น คือตัวจะตกเป็นช่วง ๆ เวลาบินจะคลี่ขนหงอนและหางออก มองไกล ๆ คล้ายผีเสื้อ นกทั้ง 2 เพศ มีลักษณะเหมือนกัน
- เขตแพร่กระจาย :** อาฟริกา ยุโรป อินเดีย จีน ไต้หวัน สุมาตรา บอร์เนียว และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ และพื้นที่เกษตรกรรม ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง 1500 ม.
- อุปนิสัย :** หากินตัวเดียว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ ใต้หากินไปตามต้นไม้เหมือนนกหัวขวาน หรือเดินหากินไปตามพื้นป่า ใช้ปากทิ่ม หรือปักลงไปบนพื้นดินหรือพื้นทราย หรือพลิกใบหญ้าไปไม้เพื่อจับแมลงกินเป็นอาหาร บางครั้งใช้ปากเคาะตามต้นไม้เพื่อหาตัวหนอนหรือแมลงเหมือนนกหัวขวาน น้อยครั้งที่จะบินจับแมลงกินในอากาศ อาหารส่วนใหญ่เป็นแมลงหรือตัวอ่อนของแมลง เช่น แมลงปีกแข็ง จิ้งหรีด ตั๊กแตน มด ปลวก และสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ โพรงดิน วางไข่ครั้งละ 5 – 7 ฟอง ตัวเมียทำหน้าที่ฟักไข่ ตัวผู้หาอาหารมาเลี้ยงตัวเมียและลูก ๆ ขณะอยู่ในรังแม่นกและลูก ๆ มีต่อมที่ขั้วของเหลวกลิ่นเหม็นออกมา เชื่อกันว่ากลิ่นนี้จะช่วยป้องกันอันตรายให้กับลูกนกที่อยู่ในรัง
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย บางครั้งหากินบนพื้นดินตามป่าหญ้าเพ็กในป่าเต็งรังหรือเกาะอยู่ตามต้นไม้
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกกระรางหัวขวาน

(ชื่ออื่น : นกกระทาขี้แห้ง นกหงอนชบา นกหัวขวาน)

### **Hoopoe**

*Upupa epops* Linnaeus, 1758.

Upupidae

Coraciiformes