

## นกหัวขวานเขียวหัวดำ

- ลักษณะ :** นกหัวขวานขนาดกลาง ลำตัวยาว 33 ซม. ปากแหลมยาวสีดำ ใบหน้าสีเทา แก้มมีแถบสีดำ ลำตัวด้านบนและปีกสีเขียว ขนปลายปีกมีลายแถบขาว ลำตัวด้านล่างสีเขียวแกมเทา ไม่มีลาย ตัวผู้ หน้าผากสีแดง กระหม่อมและท้ายทอยมีสีดำ ส่วนตัวเมีย หน้าผาก กระหม่อม และท้ายทอยสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** ยูเรเชีย อินเดีย จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาะสุมาตรา
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หากินตามลำต้นและกิ่งไม้ใหญ่ กินมด ปลวก แมลง และหนอนแมลงเป็นอาหาร ใช้ปากเคาะจิกเปลือกไม้ให้หลุดออก แล้วใช้ลิ้นยาวตวัดอาหารเข้าปาก บางครั้งกินผลไม้และน้ำหวานดอกไม้ด้วย บ่อยครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดิน
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ทำรังตามโพรงต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งปานกลางหรือไม้เนื้ออ่อน ใช้ปากขุดเจาะเอง บางครั้งใช้โพรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โพรงอยู่สูงจากพื้นดิน 2-8 ม. วางไข่ครั้งละ 4 -5 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่นกช่วยกันขุดเจาะโพรง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 16-17 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Picus canus hessei*

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกหัวขวานเขียวหัวดำ

**Grey-headed Woodpecker, Grey-head Green Woodpecker, Black-naped Green Woodpecker, Grey-faced Woodpecker**

*Picus canus* Gmelin, 1788.

Picidae

Piciformes