

นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานขนาดกลาง ลำตัวยาว 33 ซม. หัวสีดำ คอและอกส่วนบนสีเหลือง ลำตัวด้านบนและปีกสีเขียวสด ขนปลายปีกมีแถบขาว ตะโพกสีแดงสด หางสีดำ ท้องมีลายคล้ายเกล็ด ปากแหลมยาวสีเทาเข้ม ตาสีขาว ตัวผู้ มีแถบสีแดงกลางกระหม่อม
- เขตแพร่กระจาย :** เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 900 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรังด้านตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่เกาะบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ หากินตามพื้นดินบ้างเป็นบางครั้งบางครั้งอาจหาอาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ มด ปลวก ตัวหนอนของด้วงเจาะไม้ และแมลงอื่น ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไต่หากินไม่ค่อยอยู่นิ่ง
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ทำรังตามโพรงต้นไม้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือเนื้อแข็งปานกลาง ทั้งสองเพศช่วยกันขุดเจาะโพรงเอง บางครั้งก็ใช้โพรงที่เกิดตามธรรมชาติ ภายในโพรงไม่มีวัสดุรองรับ วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ไข่มีสีขาว ทั้งพ่อแม่ช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 16-17 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Picus erythrogygius erythrogygius*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง

Black-headed Woodpecker, Red-rumped Green Woodpecker

Picus erythropygius (Elliot, 1865)

Picidae

Piciformes