

## นกหัวขวานใหญ่สีเทา

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลำตัวยาว 50 ซม.ปกคลุมด้วยขนสีเทาทั้งตัว ยกเว้นบริเวณใต้คอมีสีเนื้อ และตัวผู้บริเวณแก้มมีแถบสีแดง
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดียตอนเหนือ จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และเกาะปาลาวัน
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ได้ทั้งป่าโปร่งและป่าทึบ ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ และป่าชายเลน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพื้นราบหรือเชิงเขา แต่อาจพบได้ในระดับสูงถึง 1000 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินตามลำต้นของต้นไม้ขนาดใหญ่ และมักเกาะในระดับสูงหรือค่อนข้างสูง ไม่เคยพบลงมาหากินตามพื้นดิน อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ แมลง และหนอนแมลง พฤติกรรมการหาอาหารเช่นเดียวกับนกหัวขวานอื่น ๆ คือ ใช้ปากเคาะและจิกเปลือกไม้ให้หลุดจากลำต้น แล้วใช้ลิ้นที่ยาวและเหนียวชอนไชได้เปลือกไม้ เมื่อพบเหยื่อก็ตวัดเข้าปาก
- ผสมพันธุ์ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังตามโพรงของต้นไม้ขนาดใหญ่ โพรงสูงจากพื้น 5-25 ม. ใช้ปากขุดเจาะโพรงเอง และมักใช้ดินเดิมทำรังด้วยการขุดโพรงใหม่ทุกปี ต้นไม้นั้นจึงมีโพรงหลายโพรงอยู่ใกล้กัน วางไข่ครั้งละ 3 - 4 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่นกช่วยกันเจาะโพรง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 24 - 25 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Muelleripicus pulverulentus harterti*  
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกหัวขวานใหญ่สีเทา

**Great Slaty Woodpecker**

*Muelleripicus pulverulentus* (Temminck, 1826)

Picidae

Piciformes