

นกเค้าดินทุ่ง

ลักษณะ : เป็นนกขนาดเล็กที่หากินตามพื้นดิน ความยาวลำตัว 16 ซม. ปากเรียวยาวตรง ขาค่อนข้างยาว ลำตัวตั้งตรง สีค่อนข้างทึม ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายสีน้ำตาลเข้มกระจาย ลำตัวด้านล่างมีสีเนื้อหรือสีครีม และมีลายขีดสีเข้มบริเวณอกส่วนบน มีแถบคาดตาเล็ก ๆ สีดำ คิ้วสีเนื้อลากยาวไปบรรจบกับแถบสีเนื้อที่ลากขึ้นมาข้างแก้ม ขนหางด้านบนอกมีสีขาว เห็นได้ชัดเจนบิน ตัวที่ยังโตไม่เต็มวัย จะมีลายสีเข้มกว่า

เขตแพร่กระจาย : ยุโรป แอฟริกา อินเดีย จีน เวียดนาม ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเกาะบอร์เนียว

ที่อยู่อาศัย : พบตามทุ่งหญ้า ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าปลูก ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ป่าสะแกราช

อุปนิสัย : มักพบเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินตามพื้นดิน ด้วยการไล่จิกแมลง หนอนแมลงและเมล็ดพืช และมักกระดกหางตลอดเวลา นกเค้าดิน 4 ชนิดที่พบในประเทศไทย มีนกเค้าดินทุ่งเพียงชนิดเดียวที่ทำรัง วางไข่ ในประเทศไทย

ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปถ้วย ประกอบด้วยใบหญ้า และรากพืช ร่องพื้นรังด้วยใบหญ้าที่ฉีกเป็นฝอยหรือขนสัตว์ รังวางตามพื้นดิน อยู่ตามกอหญ้าหรือวัชพืชที่ขึ้นตามทุ่งโล่ง วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่มีสีเทาอ่อนหรือสีเนื้อ มีลายสีน้ำตาลเข้ม พ่อแม่กันช่วยกัน ทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน

สถานภาพ : เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ ชนิดย่อย *rufulus* เป็นนกประจำถิ่น พบทั่วไปยกเว้นภาคใต้ ส่วนชนิดย่อย *richardi* และชนิดย่อย *sinensis* เป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว ในป่าสะแกราชพบได้ทั้ง 3 ชนิดย่อย แต่พบไม่บ่อยนัก

กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเต้าดินทุ่ง

Richard's Pipit

Anthus novaeseelandiae (Vieillot, 1818)

Motacillidae

Passeriformes