

นกเค้าลมหลังเทา

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 19 ซม. รูปร่างยาวเรียว ขาและหางยาว ลำตัวด้านบนสีเทา มีตะโพกสีเหลือง ใต้คอสีขาว ด้านท้องมีสีตั้งแต่ค่อนข้างขาวไปจนถึงออกสีเหลืองอ่อน ๆ ขนใต้โคนหางสีเหลือง และมีคิ้วขาวเห็นเด่นชัด ขณะบินเห็นแถบสีขาวพาดกลางปีก ในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะมีปิ่นสีดำใต้คอ
- เขตแพร่กระจาย :** แอฟริกา ยุโรป เอเชีย อะแลสกา อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน เกาะไต้หวัน ได้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดา ฟิลิปปินส์จนถึงนิวกีนิ
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำไหลตามหินริมลำธารที่ไหลผ่านป่าในป่าสะแกราชพบบนถนนในป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** นกเค้าลมที่พบในประเทศไทย 5 ชนิด เป็นนกอพยพทั้งสิ้น ซึ่งนกเหล่านี้ จะทำรังวางไข่ในประเทศจีนและรัสเซีย เป็นนกกกลุ่มแรกที่อพยพมาในฤดูหนาว พบได้ทุกแห่งที่ใกล้น้ำ สถานที่ชอบที่สุด คือริมลำธารน้ำไหล และที่โล่ง ชายฝั่งที่เป็นโขดหิน มักพบโดดเดี่ยว หากินตามพื้นดินด้วยการเดินหรือวิ่งไล่จับแมลง ซึ่งเป็นอาหารหลัก มักกระดกหางขึ้น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ในประเทศไทยพบชนิดย่อยเดียว คือ *Motacilla cinerea melanope*
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเด้าลมหลังเทา

Grey Wagtail

Motacilla cinerea Tunstall, 1771.

Motacillidae

Passeriformes