

## นกเงี้ยวบั้งใหญ่

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 24 ซม. เป็นนกขนาดกลาง มีลำตัวหนา ค่ายนกเงี้ยวบั้งกลางและนกเงี้ยวบั้งเล็ก แต่ขนปกคลุมลำตัวมีสีเทาเข้มกว่า ปีกมีสีดำ หางสีดำ ยกเว้นขนหางคู่นอกที่ตอนปลายเป็นสีขาว ขณะบินเห็นแถบขาวที่บริเวณขนปลายปีก(Primary) ชัดเจน ตัวเมียลักษณะคล้ายตัวผู้แต่ลำตัวด้านล่างมีลายแถบ
- เขตแพร่กระจาย :** เขือกเขาหิมาลัย จีน เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน ไต้หวัน และเกาะไหหลำ
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าดงดิบ จากเชิงเขา จนถึงระดับความสูง 1700 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าปลูกด้านตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ป่าสะแกราช
- อุปนิสัย :** ไม่แตกต่างไปจากนกเงี้ยวบั้งกลาง มักพบเป็นฝูง อาหารได้แก่แมลง หนอนแมลง ผสมพันธุ์ช่วงเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังเป็นรูปถ้วยหยาบ ๆ โดยใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ ใบไม้ ใบหญ้า เป็นวัสดุ แล้วใช้ใยแมงมุมฉาบผิววงนอก เพื่อเป็นที่ยึดวัสดุให้มั่นคงยิ่งขึ้น รังอยู่ตามง่ามไม้ ในระดับค่อนข้างสูง วางไข่ครั้งละ 2 - 3 ฟอง ทั้งพ่อแม่นกช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่นมาช่วงฤดูหนาว พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *intermedia* ซึ่งเป็นนกอพยพ ส่วนชนิดย่อย *avensis* เป็นนกประจำถิ่น

กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกเขียวขี้ใหญ่

**Black-winged Cuckoo-shrike**

*Coracina melaschista* (Hodgson, 1836)

Campephagidae

Passeriformes