

## นกขมิ้นน้อยธรรมดา

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 ซม. ด้านท้องสีเหลืองสดใต้ ปีกมีแถบขาว 2 แถบ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้มีปีกและหางสีดำ ด้านหลังตั้งแต่กระหม่อม ท้ายทอยลงไปมีสีดำ ตัวเมียลำตัวด้านบนมีสีเขียว ด้านท้องสีทึมกว่า นอกฤดูผสมพันธุ์ ทั้งสองเพศมีลักษณะคล้ายกัน ตัวผู้สีสดใสกว่า
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และเกาะปาลาวัน
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่ารุ่น ทุ่งโล่ง และสวนผลไม้ ในป่าสะแกราช ส่วนใหญ่พบบริเวณป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้าผสมป่าปลูก บางครั้งพบบริเวณที่โล่งในป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ที่หากินแยกกัน ส่งเสียงร้องเรียกกันตลอดเวลา กระโดดจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่ง คอยจ้องหาตัวหนอนและแมลงตามกิ่งไม้ ตามพุ่มใบของไม้ยืนต้น
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม รังเป็นรูปถ้วยเล็ก ๆ ทำรังด้วยต้นหญ้าและกิ่งไม้เล็ก ๆ เชื่อมกันด้วยใยแมงมุม สูงจากพื้นดินแตกต่างกัน อยู่ตามง่ามไม้ของไม้ต้นหรือไม้พุ่ม วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่มีสีขาวแกมชมพูจาง มีลายดอกดวงสีน้ำตาลแกมม่วง พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ประมาณ 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Aegithina tiphia cambodiana*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกขมิ้นน้อยธรรมดา  
(ชื่ออื่น : นกขมิ้นน้อยสวน)

**Common Iora**

*Aegithina tiphia* (Linnaeus, 1758)

Chloropseidae

Passeriformes