

นกแขวงเขาวงกต

- ลักษณะ :** คล้ายนกแขวงหางปลา แต่ลำตัวเป็นสีเทา ซึ่งอาจเป็นสีเทาอ่อน จนถึงสีเทาเข้มเกือบดำ ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดย่อย (ไทยมี 6 ชนิดย่อย) ลำตัวด้านหลังมักมีสีเข้มกว่าด้านท้อง ตาสีแดง ขาสีดำ หางเว้าลึก ชนิดย่อย *leucogenis* ที่อพยพเข้ามามีสีเทาอ่อน แก้มสีขาว ชนิดที่พบในป่าสะแกราช มีสีเทาเข้ม
- ที่อยู่อาศัย :** พบทั้งในป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน จากที่ราบไปจนถึงยอดสูงสุด ในป่าสะแกราชพบได้ทุกสภาพป่า ทั้งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าปลูก บริเวณป่าผสมระหว่างป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง และบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- เขตแพร่กระจาย :** อฟกานิสถาน จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ใต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และเกาะปาลาวัน
- อุปนิสัย :** พบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ มักเกาะตามกิ่งไม้ในระดับค่อนข้างสูง กินแมลงเป็นอาหาร โดยโฉบจับกลางอากาศ บางครั้งโฉบจับในระดับต่ำใกล้พื้นดิน บางครั้งพบกินน้ำหวานจากดอกไม้ด้วย โดยเฉพาะนกที่กำลังหัดบิน เมื่อเกิดไฟป่า มันจะบินระดับสูง เพื่อคอยโฉบจับแมลงที่บินหนีไฟป่าขึ้นไป เป็นนกที่ก้าวร้าว และป้องกันอาณาเขตอย่างแข็งขัน มักไล่โฉบตีกที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยเฉพาะเหยี่ยวที่เข้าใกล้รังหรืออาณาเขตที่ครอบครองอยู่
- ผสมพันธุ์ในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม รังเป็นรูปถ้วยตื้น ๆ ทำจากกิ่งไม้เล็ก ๆ ไผ่เคน ใบหญ้า รังมักอยู่ตามง่ามไม้เกือบปลายกิ่ง สูงจากพื้นดิน 10 – 20 ม. วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง พ่อแม่กันช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 14 – 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ในป่าสะแกราชพบชุกชุม ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ช่วงเวลาอื่นพบแต่ไม่บ่อย กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกแซงแซวสีเทา

Ashy Drongo

Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817

Dicruridae

Passeriformes