

## นกแขวงแขวงอนขน

- ลักษณะ :** มีขนาดเท่านกเอี้ยง ลำตัวยาว 32 ซม. มีขนสีดำเหลือบเป็นประกาย หางค่อนข้างยาว ปลายหางกว้าง ปลายตัดไม่เป็นแฉก ปลายขนหางค่อนข้าง ๗ โค้งม้วนงอขึ้น จะงอยปากยาว เรียวแหลม และโค้งลงเล็กน้อย บริเวณหน้าผากมีขนยาวมาก ลักษณะคล้ายกับขนหรือผมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (hair) และอาจยาวไปถึงกระหม่อม ในธรรมชาติสังเกตเห็นได้ยาก ทั้ง 2 เพศมีลักษณะคล้ายกัน
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่ารุ่น จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 2,000 ม. โดยเฉพาะช่วงอพยพ ในป่าสะแกราชพบในป่าเต็งรัง พบบนต้นจิ้งหว้าปริมาณทางเข้าที่ทำการสถานี ฯ
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นมาเลเซีย และสิงคโปร์
- อุปนิสัย** พบหากินโดดเดี่ยว หรืออยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ บางครั้งพบถึง 20 ตัว หรือมากกว่านั้น เป็นนกที่กินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารหลักโดยเฉพาะทองหลางป่า จั้วป่า และดอกไม้อื่น ๆ จะงอยปากที่ยาวแหลมและโค้งลงเป็นวิวัฒนาการที่ปรับตัวให้เหมาะสำหรับกินน้ำหวานจากดอกไม้ มักพบละอองเกสรติดที่หน้าผาก หรือขนตามลำคอ เป็นตัวสำคัญที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ ช่วยกระจายพันธุ์พืชในป่า นอกจากกินน้ำหวานแล้ว ยังกินตัวหนอนและแมลงเป็นอาหารด้วย เป็นนกที่ก้าวร้าว และป้องกันอาณาเขตอย่างแข็งขัน มักบินโฉบไล่ตีกและสัตว์อื่นที่เข้าไปใกล้รัง
- ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังเป็นรูปถ้วย ประกอบด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ เปลือกไม้ ต้นหญ้า รากไม้ เถาวัลย์ และใยแมงมุม พื้นรังไม้ มีวัสดุรอง สามารถมองเห็นไข่จากด้านล่าง รังมักอยู่ตามง่ามไม้เกือบปลายกิ่ง สูงจากพื้นดิน 5 – 10 ม. ไข่ 3 – 4 ฟอง ไข่แต่ละฟองมีสีและลวดลายต่างกัน ทั้งสองเพศช่วยกันทำรัง กกไข่ และเลี้ยงดูลูกนก ใช้เวลาฟักไข่ 14 – 15 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพผ่าน และนกอพยพมายังประเทศไทยช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ในสะแกราชพบไม่บ่อยนัก และปริมาณไม่ชุกชุม
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกแซงแซวหางอนขน

**Hair-crested Drongo, Spangled Drongo**

*Dicrurus hottentottus* (Linnaeus, 1766)

Dicruridae

Passeriformes