

นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ตัวยาว 12 ซม. รูปร่างป้อม คอสั้น ปากเล็กแหลมที่โคนปากมีขนแข็งสั้น ๆ นกตัวผู้มีหน้าผากสีดำคล้ายกำมะหยี่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของนกชนิดนี้ มีเส้นสีดำจากด้านหลังของตาไปถึงต้นคอ ปากสีส้มสด ขนคลุมตัวด้านบนสีฟ้าอมม่วง คอและอกสีขาว ท้อง สีขำ และขนคลุมโคนหางสีม่วงอมชมพูเรื่อ ๆ นกตัวเมียคล้ายนกตัวผู้แต่ไม่มีเส้นสีดำด้านหลังของตา
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ เมียนมาร์ จีน เกาะไหหลำ สุมาตรา ในไทย พบได้บ่อยทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าผสมผลัดใบ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ตั้งแต่พื้นราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม. ที่สะแกราชพบตามกิ่งไม้สูง ๆ ในป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** ปกติจะหากินอยู่ใกล้ ๆ กันตั้งแต่ 6 – 20 ตัว ตามเปลือกของต้นไม้ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับนกหัวขวาน (Woodpeckers) และนกเปลือกไม้ (Treecreepers) ไต่ต้นไม้ได้เก่งมาก สามารถไต่ไปได้ทุกแนว ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไต่ขึ้นหรือไต่ลง ขณะไต่ไปตามลำต้นหรือกิ่งไม้นั้น มันจะไต่ได้เร็วมาก และไต่ไปเรื่อย ๆ นาน ๆ จึงจะหยุดพักเสียทีหนึ่ง อาหารเป็นพวกแมลงเล็ก ๆ เช่น มด ปลวก หนอน แมงมุม ที่อาศัยอยู่ตามซอกของเปลือกไม้ เป็นนกที่ขยันหากินตลอดทั้งวัน ปกติจะหากินอยู่ระดับเรือนยอดและระดับกลางของต้นไม้ใหญ่ แล้วไต่ลงมาเรื่อย ๆ จนถึงโคนต้น หลังจากนั้นก็จะบินไปยังต้นไม้อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ ต่อไป เวลาบินจะบินขึ้น ๆ ลง ๆ แบบลูกคลื่น นาน ๆ จึงจะพบหากินตามขอนไม้หรือต้นไม้ที่โคนล้มอยู่บนพื้นดิน แต่จะไม่ลงมาหากินบนพื้นดิน
- ผสมพันธุ์ในฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 3 – 6 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ราว 13 – 14 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่นที่พบได้บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่
(ชื่ออื่น : นกไต่ไม้)

Velvet – fronted Nuthatch

Sitta frontalis Swainson, 1820.

Sittidae

Passeriformes