

นกกินแมลงหัวแดงเล็ก

ลักษณะ : เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 ซม. บริเวณกระหม่อมมีสีน้ำตาลแดง ท้ายทอยสีดำ มีลายเกล็ดสีดำบนกระหม่อม แต่สังเกตเห็นได้ยากในธรรมชาติ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว มีหางสีน้ำตาลแดง ลำตัวด้านล่างสีออกขาว แต่บริเวณอกสีออกครีม ขาสีชมพู

เขตแพร่กระจาย : เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และหมู่เกาะซุนดาใหญ่

ที่อยู่อาศัย : อาศัยตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง

อุปนิสัย : หากินเป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ และมักพบอยู่ร่วมกับนกกินแมลงชนิดอื่น ๆ อาหารได้แก่แมลง และหนอนแมลง

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ังเป็นรูปถ้วย ทำรังตามพุ่มไม้หรือไม้พุ่มกลางแจ้งพื้นดิน สูงจากพื้นดินราว 1.2 ม. วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีครีมปนน้ำตาล มีจุดสีแดง หรือสีน้ำตาล ยังไม่ทราบชีววิทยาการสืบพันธุ์ด้านอื่น

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ

Malacopteron cinereum indochinensis

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกินแมลงหัวแดงเล็ก

**Scaly-crowned Babbler, Lesser Red-headed Babbler,
Lesser Red-headed Tree Babbler**

Malacopteron cinereum Eyton, 1839

Timaliidae

Passeriformes