

## นกยูงเต็นหางสั้น

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก 13 – 17 ซม. มีหางสั้น ขาและปากแข็งแรงคล้ายนกยูงเต็นเขาปูน แต่ขนาดเล็กกว่า และด้านบนลำตัวซึ่งมีสีน้ำตาลคล้ำมีลายถี่มากกว่า ด้านท้องมีสีน้ำตาลแดง ใต้คอมีลายขีดสีน้ำตาลแกมเทา แต่ไม่เด่นชัดนัก
- เขตแพร่กระจาย :** ตั้งแต่รัฐอัสสัมจนถึงจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าดงดิบ ตั้งแต่เชิงเขาจนถึงระดับความสูง 1,600 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หากินตามพื้นดินและกิ่งของไม้พุ่มด้วยการกระโดดไปมา ไม่ค่อยบิน แม้จะมีภัย แต่จะกระโดดหนีเข้าไปในพุ่มไม้ที่รกทึบกว่า อาหารได้แก่ แมลง และตัวหนอน ปกติมักซ่อนตัวตามพุ่มไม้ ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือส่งเสียงร้อง ทำให้เห็นตัวได้ยาก
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังตามพื้นดิน หรือโคนไม้พุ่มหรือไม้พุ่มต่ำ รังเป็นรูปทรงกลม มีทางเข้าออกอยู่ทางด้านข้างเกือบปลายบนสุด รังทำด้วยใบไม้แห้ง ใบเฟิน ต้นมอส และรากฝอย รองพื้นรังด้วยใบไม้แห้ง วางไข่ครั้งละ 2 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาว มีลายสีแดงแกมชมพู พ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือชนิดย่อย *brevicaudata*
- กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจู้เต๋นหางสั้น

**Streaked Wren-Babbler**

*Napothera brevicaudata* (Blyth, 1855)

Timaliidae

Passeriformes