

นกกระจัดขาถี่เนื้อ

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 13 ซม. หัวสีเทาเข้ม ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมน้ำตาล ตะโพกสีน้ำตาลแกมแดง ลำตัวด้านล่างสีขาว มีคิ้วขาวเห็นเด่นชัด ปีกมีแถบแคบ ๆ 2 แถบ แต่ไม่เด่นชัดขาสีจางกว่านกกระจัดอื่น ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีนด้านตะวันออกและใต้ เกาะไหหลำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะนิโคบาร์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่ารุ่น ป่าชายเลน และสวนผลไม้ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1500 ม. ในป่าสะแกราชพบได้ทั้งในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** ส่วนใหญ่พบเป็นฝูงเล็ก ๆ มักหากินใกล้พื้นดิน หาอาหารจำพวกแมลง และหนอนแมลงตามพุ่มไม้ ไม้พื้นล่าง หรือกิ่งไม้ระดับต่ำ
- การผสมพันธุ์ ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ ในประเทศไทย
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาในช่วงฤดูหนาว พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจัดขาดีเนือ

Pale-legged Leaf-Warbler, Pale-legged Warbler, Pale-legged Willow Warbler

Phylloscopus tenellipes Swinhoe, 1860.

Sylviidae.

Passeriformes