

นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 13 ซม. รูปร่างเพรียว หางยาว หัวสีเทา ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง บริเวณท้องและใต้โคนหางสีเหลือง ส่วนอกและใต้คอสีออกขาว มีคิ้วขาวสั้น ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** พบตั้งแต่ป่ากึ่งถาวรจนถึงจันทอนใต้ เกาะไหหลำ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าหญ้า ป่าละเมาะ บริเวณชายแหล่งน้ำ รวมทั้งริมป่าชายเลน และทุ่งโล่ง จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 800 ม. ในป่าสะแกราชพบตามพงหญ้า ไม้พื้นล่างในป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ หากินภายในพุ่มกอหญ้า อ้อ กก หรือพุ่มไม้ ทำให้มองเห็นตัวได้ยาก นอกจากนี้ขึ้นมาเกาะบนยอดหญ้าในบางครั้ง อาหารได้แก่ แมลง และหนอนแมลงผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปเกือบทรงกลมหรือรูปไข่ มีทางเข้าออกด้านข้าง รังทำด้วยใบหญ้า รากหญ้า และใบไม้ เชื่อมหรือเย็บติดกันด้วยใยแมงมุม รังพื้นรังด้วยดอกหญ้า รังสูงจากพื้นดิน 50 – 150 ซม. วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง ไข่สีน้ำตาลแดง พ่อแม่ช่วยกันทำรัง พักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะพักไข่ 12 วัน รังของนกกระจิบหญ้าท้องเหลืองมักมีนกคัคคูขนาดเล็กหลายชนิดแอบเข้ามาวางไข่ทิ้งไว้ให้เลี้ยงดูลูกอ่อนแทน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Prinia flaviventris delacouri* ซึ่งเป็นชนิดย่อยที่พบทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง

Yellow bellied Prinia, Yellow-bellied Wren Warbler

Prinia flaviventris (Delessert, 1840)

Sylviidae

Passeriformes