

นกกระเจิบหญ้าสีเรียบ

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 ซม. คล้ายนกกระเจิบหญ้าสีข้างแดง(Rufescent Prinia) แต่ขนาดใหญ่กว่า หางยาวกว่า มีคิ้วยาวสีขาว ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลอ่อน ลำตัวด้านล่างสีเนื้อ ปากสีน้ำตาล โดยปากล่างสีเนื้อ ขาสีชมพู
- เขตแพร่กระจาย :** พบในป่ากึ่งถาวรจนถึงจันทอนใต้ เกาะไหหลำ เวียดนาม ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าโปร่ง พื้นที่ค่อนข้างชื้น บริเวณป่าหญ้า กก อ้อ หรือป่าละเมาะที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทุ่งนา พื้นที่เกษตรกรรม และชายป่าชายเลน จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 800 ม. ในป่าสะแกราชพบตามพงหญ้า ในป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ หากินในพงหญ้า ทำให้มองเห็นตัวได้ยาก นอกจากบางครั้งเกาะบนยอดหญ้าสูง ส่งเสียงร้อง “จืด-จืด-จืด” รวดัง พร้อมทั้งกระดกหางไปด้วย อาหารได้แก่ แมลง และหนอนแมลง
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม ทำรังตามกอหญ้าโดยการโน้มใบพืชหลายใบมารวมกันตรงกลาง ใช้ใยพืชหรือใยแมงมุมเย็บให้ติดกัน และอาจต้องยึดกับลำต้นอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ดูคล้ายกระบองหรือแจกัน มีทางเข้าออกด้านบน พื้นรังปูด้วยใบไม้แห้งหรือดอกหญ้า วางไข่ครั้งละ 3 – 6 ฟอง ไข่มีสีขาว มีลายจุดขนาดใหญ่สีน้ำตาลและสีแดง พ่อแม่นกช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 11 – 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อย ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Prinia inornata herberti*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจิบหญ้าสี่ริ้ว

**Plain Prinia, Tawny-flanked Prinia, Plain Wren-Warbler,
Greater Brown Wren-Warbler**

Prinia inornata Sykes, 1832

Sylviidae

Passeriformes