

นกกะจิบธรรมดา

ลักษณะ : เป็นนกกขนาดเล็ก ความยาวจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 13 ซม. ขนบริเวณหลัง ไหล่ ตะโพก หาง มีสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ส่วนล่างของลำตัว ตั้งแต่ คาง ใต้คอ หน้าอก จนถึงท้องและขนคลุมใต้โคนหางเป็นสีขาวมอ ๆ แกมเหลืองอ่อน หน้าผากมีสีแดงเจือน้ำตาล นกชนิดนี้คล้ายคลึงกับนกกะจิบคอดำแต่นกกะจิบคอดำมีส่วนบนของลำตัวเป็นสีเขียวสดกว่า ขนคลุมใต้โคนหางเป็นสีเหลือง บนหัวมีสีน้ำตาลปนแดงเต็มทั้งหัว และเฉพาะนกตัวผู้เท่านั้นที่มีสีดำบริเวณสองข้างคอ เป็นปื้นใหญ่เห็นได้ชัด ส่วนนกกะจิบธรรมดาทั้ง 2 เพศ จะคล้ายคลึงกันมาก ในฤดูผสมพันธุ์ นกตัวผู้จะมีขนหางคู่กลางยาวกว่าตัวเมียมาก นกที่ยังโตไม่เต็มวัย มีสีส้มคล้ายตัวเมีย แต่ไม่มีสีแดงเจือน้ำตาลบนกระหม่อม และสีหม่นกว่า

เขตแพร่กระจาย : พบในปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ เกาะฮ่องกง เมียนมาร์ ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และ เกาะชวา ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค

ที่อยู่อาศัย : พบอาศัยอยู่ตามป่าละเมาะ ป่ารุ่น พื้นที่โล่งที่มีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจาย ป่าโปร่ง ป่าชายเลน สวนผลไม้ แม้กระทั่งทุ่งพุ่มไม้รอบ ๆ บ้าน ในป่าสะแกราชพบทั้งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่ารุ่น

อุปนิสัย : มักพบหากินโดดเดี่ยว บางครั้งพบหากินเป็นคู่ แต่แยกย้ายกันอยู่ห่าง ๆ เป็นนกที่ว่องไว คล่องแคล่ว ขยันหากิน ชอบกระโดดหากินอยู่ภายในพุ่มไม้ ตามต้นไม้เตี้ย ๆ หรือตามกิ่งล่างของต้นไม้สูง มันกระโดดหากินเรื่อยไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขณะกระโดดหากินก็ร้องไปด้วย จิบ จิบ จิบ จิบ มีพลังเสียงมากอย่างไม่น่าเชื่อ ขณะร้องมักกระดกหางขึ้น ๆ ลง ๆ หรือแกว่งไปซ้ายขวาตลอดเวลา อาหารได้แก่ แมลง หนอน ที่อยู่ตามกิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ พอพบเหยื่อ มันจะใช้ปากจิกกินทันทีอย่างรวดเร็ว และยังชอบกินน้ำหวานจากดอกไม้ เช่น ดอกจี่ว ทองหลาง ทองกวาว ฯลฯ

ผสมพันธุ์ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ในฤดูกาลนี้จะส่งเสียงร้องไม่ขาดระยะ ปกติทำรังสูงจากพื้นดินไม่เกิน 1 ม. มักทำรังอยู่ในพุ่มไม้ หรือต้นไม้เตี้ย ๆ ที่มีใบค่อนข้างใหญ่ และมักเลือกทำรังอยู่ใต้ใบ เพื่อกันมิให้น้ำฝนตกลงไปในรัง โดยชั้นแรกจะรวบใบไม้ที่อยู่ติดกัน 2 – 3 ใบ เข้าด้วยกันจนกลายเป็นกรวย บางครั้งใช้ใบไม้ใหญ่ ๆ เพียงใบเดียว รวบขอบทั้งสองข้างเข้าหากันจนกลายเป็นกรวย จากนั้นใช้ปากอันแหลมคม

เจาะริมใบไม้ 2 ใบ นี้อยู่ชิดกัน ให้เป็นรูตรงกันหลาย ๆ รู แล้วคาบเอาใบพืช หรือใยแมงมุมที่เหนียว ๆ มาเย็บให้ติดกัน จนเป็นกรวยที่หนาแน่นมาก ขึ้นต่อไปหาวัสดุรองรับ เช่น ฝุ่น ผม ขนสัตว์ หรือเส้นใยพืช ทั้งพ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ไข่มีรูปร่างค่อนข้างยาว มีสีส้มต่างกัน 2 แบบ แบบแรกเป็นสีเขียวจนถึงสีครีม อีกแบบหนึ่งเป็นสีฟ้าจาง ๆ จนถึงฟ้าสด หรือสีเขียวน้ำตาล มีลายจุดสีน้ำตาลแดง พ่อแม่นกผลัดกันกกไข่ ระยะฟักไข่ใช้เวลาราว 12 วัน

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่นที่พบน้อยมากในป่าสะแกราช
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจิบธรรมดา

Common Tailorbird

Orthotomus sutorius (Pennant, 1769)

Sylviidae

Passeriformes