

นกกระจอยหัวถาย

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 11 ซม. หางสั้น กระหม่อมมีลายเกล็ด แต่ในธรรมชาติสังเกตเห็นได้ยาก มีควิวาวสีครีม แถบคาดตาสีดำ บริเวณขนคลุมหูและคอด้านข้างมีลายเกล็ดสีเทา ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว แข็งและนิ้วมีสีเนื้อหรือสีชมพูจาง ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีนด้านตะวันตก เกาหลีเหนือ ไต้หวัน เมียนมาร์ ไทย ลาว และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่ ตั้งแต่เชิงเขา จนกระทั่งความสูง 2,000 ม. มักพบใกล้แหล่งน้ำ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าปลูก
- อุปนิสัย :** ส่วนมากพบหากินตามพื้นดิน ชอบหลบซ่อนตัวตามพุ่มไม้หรือไม้พื้นล่าง ทำให้เห็นตัวได้ยาก นอกจากได้ยินเสียงร้องหรือขณะบินหนี อาหารได้แก่แมลงและหนอนแมลง
ไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ในประเทศไทย
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพย้ายถิ่นมาในช่วงฤดูหนาว พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระจ๊อยหัวลาย

**Stub-tailed Bush Warbler, Asian Stubtail, Scaly headed Bush Warbler,
Swinhoe's Bush Warbler, Short-tailed Bush Warble**

Cettia squameiceps (Swinhoe, 1863)

Sylviidae

Passeriformes