

นกจับแมลงคอแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 13 ซม. ปากและขาสีดำ หัวและลำตัวด้านบนมีสีเทาอมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างสีขาว บริเวณอกมีสีเทาจาง ๆ หางสีดำ ขนหางคู่บนอกมีลายแถบสีขาว ฤดูผสมพันธุ์ บริเวณคอของตัวผู้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงอมส้ม หัวและลำตัวด้านบนมีสีเทา
- เขตแพร่กระจาย :** พบในยุโรป เอเชียตอนเหนือ แอฟริกาตอนเหนือ อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ และเกาะบอร์เนียว
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ชายป่า สวนผลไม้ และป่าละเมาะ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 2000 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง และป่าปลู๊ก
- อุปนิสัย :** อาศัยหากินตามกิ่งของไม้พุ่มหรือต้นไม้ระดับต่ำ โฉบจับแมลงกลางอากาศ บ่อยครั้งลงมาจับแมลงตามพื้นดิน ส่งเสียงร้องดัง ขณะเกาะมักกระดกหางขึ้นลงและแผ่หางออก
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพย้ายถิ่นเข้ามาช่วงฤดูหนาว ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อย พบช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม นกจับแมลงคอแดงพบเพียงชนิดย่อยเดียวในประเทศไทย คือ *Ficedula parva albicilla*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงคอแดง

Red-throated Flycatcher

Ficedula parva (Bechstein, 1792)

Muscicapidae

Passeriformes