

นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 15 ซม. ตัวผู้ด้านหลังมีสีน้ำเงิน คอและอกมีสีส้มหรือสีน้ำตาลแดงแผ่ไปจนถึงใต้ท้องซึ่งมีสีขาว หน้าผากมีสีฟ้าเป็นประกาย บริเวณขนคลุมหัวมีสีดำ ตัวเมียด้านหลังสีน้ำตาล คอ และอกสีน้ำตาลแดง ใต้ท้องสีออกขาว
- เขตแพร่กระจาย :** เนปาล จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เกาะชวา เกาะบอร์เนียว และเกาะปาลาวัน
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ความสูงระหว่าง 400 – 1200 ม. ช่วงอพยพอาจพบตามพื้นที่ราบ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** มักอาศัยและหากินตามพุ่มไม้ และกิ่งไม้ระดับต่ำ กินแมลงเป็นอาหาร โดยจับแมลงกลางอากาศใกล้ที่เกาะ บางครั้งลงไปจับเหยื่อตามพื้นดิน
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปถ้วย ทำด้วยมอส รังอยู่ตามโพรงไม้ ตอไม้ ซอกหิน และดงริมห้วย ที่ปกคลุมด้วยพืชหนาแน่น วางไข่ครั้งละ 4 – 5 ฟอง ไข่มีสีฟ้า หรือสีน้ำตาลอ่อน มีลายดอกดวงเล็ก ๆ พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 11 – 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพผ่าน และนกอพยพช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราชคือ *Cyornis banyumas lekhakuni*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง

Hill Blue Flycatcher

Cyornis banyumas (Horsfield, 1821)

Muscicapidae

Passeriformes