

นกแอ่นพง

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 18 ซม. อ้วนป้อม คอสั้น จะงอยปากโคนหนาปลายแหลม หัวและลำตัวด้านหลังสีเทาเข้มจนเกือบเป็นสีดำ ออกตอนล่าง ใต้ท้อง สีออกเทาอมน้ำตาล ขนคลุมบนโคนหางสีออกเทาอ่อน ปากสีเทาอมฟ้า ปลายปากสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย เมียนมาร์ ไทย และอินโดจีน (ไทยพบทุกภาคยกเว้นภาคใต้)
- ที่อยู่อาศัย :** ที่โล่ง ซึ่งมีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นกระจัดกระจาย ชายป่า ตามท้องไร่ท้องนา ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าปลูกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ป่าสะแกราช
- อุปนิสัย :** ชอบเกาะรวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ บนกิ่งไม้แห้งเด่น ๆ ของต้นไม้สูง หรือพบเกาะตามสายไฟฟ้าริมถนน เป็นนกสังคมอย่างแท้จริง เวลาพักผ่อนจะเกาะเบียด ๆ กัน เกาะนอนเบียดกันแน่นมาก ฝูงหนึ่งจะมีนกราว 15 – 20 ตัว และบางทีก็ใช้ขนให้กันและกันด้วยบินได้คล่องแคล่ว และชำนาญสามารถกางปีกอ่อนไปในท้องฟ้าได้เป็นเวลานาน ๆ มีความสามารถในการบินโฉบบินแมลงกลางอากาศได้เก่ง พอ ๆ กับนกนางแอ่น นอกจากกินแมลงแล้ว ยังชอบกินน้ำหวานและเกสรดอกไม้ด้วย โดยเฉพาะดอกทองหลางป่า ดอกจิวป่า
- ผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ชอบทำรังในโพรงบนต้นไม้หรือหัวเสา บนต้นตาลหรือบนโคนก้านใบที่หลุดแล้ว โดยคาบเอากิ่งไม้เล็ก ๆ มาขัดสานกันไว้หยาบ ๆ แล้วรองรังด้วยต้นพีชเล็ก ๆ วางไข่ครั้งละ 2 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาวหรือสีเนื้อ มีจุดกระสีแดงทางด้านบ้านของไข่ ทั้งสองเพศช่วยกันกกไข่ ระยะฟักไข่ 12 – 16 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น ในป่าสะแกราชพบชุกชุมเฉพาะที่ คือพบเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าปลูกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกแอ่นพง

Ashy Wood-swallow

Artamus fuscus Vieillot, 1817.

Artamidae

Passeriformes