

นกกิ้งโครงคอดำ

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 28 ซม. นกตัวผู้และนกตัวเมียมีสีขนเหมือนกัน มีหัวขาวโพลน จะงอยปากสีดำ มีปลอกคอสีดำ ลำตัวด้านล่างสีขาว คอ ส่วนบนของลำตัว คือ หลัง ไหล่ รวมทั้งปีกเป็นสีน้ำตาลแกมดำ ปลายหางสีขาว นกที่ยังโตไม่เต็มวัย จะไม่มีแถบสีดำล้อมรอบคอ ทั้งหัว คอ หน้าอก ท้องเป็นสีเทาออกน้ำตาลอ่อน ๆ
- ที่อยู่อาศัย :** ชอบอาศัยอยู่ตามที่โล่งที่มีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นกระจุกกระจาย ไร่ นา และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ รวมทั้งป่าละเมาะ พบทั้งภายในหมู่บ้านและตัวเมือง พบตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่งของทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้าผสมป่าปลูก และพบในป่าเต็งรังบ้าง
- เขตแพร่กระจาย :** แพร่กระจายตั้งแต่จีนตอนใต้ เมียนมาร์ ลาว ไทย เขมร และเวียดนาม
- อุปนิสัย :** ชอบเดินหากินตามพื้นดินและสนามหญ้า พบหากินตามลำพังหรือเป็นคู่ เดินหากินไปก็ส่งเสียงร้องไปด้วย อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ผลไม้สุก แมลง หนอนหรือไส้เดือน เวลาเย็นหรือใกล้ค่ำ มักจะบินไปเกาะพักผ่อนหลับนอนในบริเวณเดียวกันนับหลายร้อยตัวทีเดียว เป็นนกที่สามารถสอนให้เลียนเสียงมนุษย์ได้เช่นเดียวกับนกขุนทอง แต่มีผู้นิยมเลี้ยงน้อยกว่านกขุนทอง
- จับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม มักทำรังไว้บนยอดไม้หรือใกล้ยอดไม้ รังทำด้วยใบไม้ หญ้าแห้งและกิ่งไม้เล็ก ๆ รูปทรงกลมค่อนข้างใหญ่และหนามาก ตรงกลางเป็นแอ่งใช้วางไข่ วางไข่ครั้งละ 3 – 4 ฟอง ไข่มีสีฟ้าแกมเขียวจาง ๆ พ่อแม่ช่วยกันกกไข่จนฟักเป็นตัว
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่นที่ทั่วไปพบได้บ่อยมาก แต่ในป่าสะแกราชพบน้อย
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกิ้งโครงคอดำ

Black-collared Starling

Sturnus nigricollis (Paykull, 1807)

Sturnidae

Passeriformes