

นกกินปลีคอแดง

ลักษณะ : เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 11 ซม. นกตัวผู้มีหัว ด้านหลัง คอและอกสีแดงสดใส มุมปากมีแถบสีม่วงแคบ ๆ ลากลงสู่คอ ท้องสีเทา หน้าผากและหางมีสีเขียวเป็นประกาย หางยาว ขนหางคู่กลางยื่นยาวออกไปอีก 2.5 – 3 ซม. ตะโพกมีแถบสีเหลือง ตัวผู้นอกฤดูผสมพันธุ์สีออกเขียวคล้ำทั้งตัว มีแต้มสีแดงเรื่อ ๆ ใกล้เคียงและบนอก และไม่มีขนหางยาว ตัวเมีย ด้านหลังสีเขียวคล้ำ ด้านท้องสีเขียวแกมเหลือง ตะโพกไม่มีแถบสี

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะนิโคบาร์ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ เกาะสุลาเวซี และฟิลิปปินส์

ที่อยู่อาศัย : พบตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่ารุ่น ชายป่า และสวนผลไม้ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1000 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง

อุปนิสัย : มักพบเป็นคู่ อาศัยและหากินตามกิ่งและยอดไม้ เป็นนกที่ไม่หยุดนิ่ง บินและกระโดดไปมาตามกิ่งไม้ตลอดเวลา อาหารได้แก่น้ำหวานจากดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกาฝาก นอกจากนั้นยังกินแมลงและหนอนแมลงบ้าง

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปกระเปาะมีหางยาว แขนงตามกิ่งไม้ในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินมากนัก มีทางเข้าออกด้านข้าง รังทำด้วยใบหญ้าใบไม้ เชื่อมติดกันด้วยใยแมงมุม ร่องรังด้วยดอกหญ้า และรากฝอย วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีชมพู มีลายจุดสีแดง นกตัวเมียเป็นผู้สร้างรัง และหาวัสดุสร้างรังแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งพ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน โดยตัวเมียทำหน้าที่มากกว่า

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *cara*

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกินปดืคอดแดง

Crimson Sunbird

Aethopyga siparaja (Raffles, 1822)

Nectariniidae

Passeriformes