

เหยี่ยวนกเขาชिकรา

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 30-36 ซม. นกตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ขนด้านหลังสีน้ำตาลอมเทา แต่ในตัวผู้หลังเป็นสีเทา ขนด้านล่างลำตัวเป็นสีขาว มีลายขวางเล็ก ๆ สีน้ำตาลแดง กางสีขาว
- เขตแพร่กระจาย :** ทวีปแอฟริกา เอเชียตอนใต้ จีนตอนใต้ ไทหฺล้า หมู่เกาะนิโคบาร์ สุมาตรา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป ยกเว้นตอนใต้สุดของประเทศ
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่ารุ่ม
- อุปนิสัย :** ชอบเกาะอยู่ตามกิ่งไม้สูงเด่น บางครั้งจะบินร่อนในช่วงสั้น ๆ พุ่งลงไปจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว กินแมลง สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น นก หนู และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 18-21 วัน
- สถานภาพ :** มีทั้งนกประจำถิ่น และนกอพยพ พบไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่พบในป่าเต็งรัง ครั้งละ 1 ตัว







เหยี่ยวนกเขาชिकรา
(ชื่ออื่น: เหยี่ยวนกเขาชิกรา)

Shikra

Accipiter badius