


นกอีเสือหลังแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดกลาง ลำตัวยาว 20 ซม. หัวค่อนข้างโต ปากงุ้ม หางยาว ขนด้านหลังสีน้ำตาลแดง ส่วนกระหม่อม ท้ายทอย และแผ่นหลังส่วนบนมีสีเทา มีแถบสีดำคาดตา ปีกสีน้ำตาลแดง มีแถบสีขาวเล็ก ๆ บริเวณโคนขนปลายปีก จะเห็นได้ชัดเจนบิน ได้ทั้งสีน้ำตาลอ่อนเกือบขาว หางยาวสีดำและขนหางด้านนอกสีขาว ตัวผู้บริเวณหน้าผากมีสีดำ ส่วนตัวเมียหัวมีสีเทา บริเวณหัวตามีสีขาว ปีกและหลังมีสีน้ำตาลแดงจางกว่า
- เขตแพร่กระจาย :** พบในรัฐอัสสัม จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ ป่าโปร่ง ทุ่งโล่ง ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรม ในป่าสะแกราช พบบริเวณที่โล่ง ทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** เป็นนกที่อพยพเข้ามาในบริเวณป่าสะแกราชต้นฤดูหนาว พบหากินตามลำพัง เกาะกิ่งไม้และยอดพุ่มไม้ในที่โล่ง กินแมลงและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด สัตว์เลื้อยคลานเป็นอาหาร ด้วยการโฉบจับตามพื้นดิน ทำรังเป็นรูปถ้วยตามพุ่มไม้หรือตามต้นไม้นขนาดเล็ก
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ในป่าสะแกราช พบบ่อยเฉพาะบริเวณที่โล่งทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรังในช่วงฤดูอพยพ กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง









นกอีเสือหลังแดง

Burmese Shrike

Lanius collurioides Lesson, 1834