

จ๊ว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bombax ceiba* L.

ชื่อสามัญ Kapok tree, Cotton tree, Red cotton tree, Shaving brush, Silk cotton tree.

ชื่อพื้นเมือง จ๊ว, จ๊วบ้าน (นครราชสีมา, ทวีป); จ๊วแดง (กาญจนบุรี); จ๊วปง, จ๊วปงแดง, สะเน็ม, ระกา (ชอง – จันทบุรี)

ชื่อวงศ์ BOMBACACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น จ๊วเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20 – 30 เมตร ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ลำต้นตรงและแตกกิ่งตั้งฉากกับลำต้นเป็นชั้นๆ เรือนยอดแผ่กว้าง
ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5 – 7 ใบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ก้านใบยาว ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม เปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนหลุดร่วง

ดอก ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงรูปถ้วย สีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ สีแดงหรือสีส้ม ออกดอกเดือนธันวาคม – มกราคม

ผล ผลรูปรี ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลเทา เมื่อแก่จัดแตกออกเป็นแฉก เมล็ดสีดำ มีขนสีขาวคล้ายปุยฝ้ายหุ้มจำนวนมาก ออกผลเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง ป่าคันทนา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ฤดูร้อน และเก็บดอกแห้งไว้รับประทานได้ตลอดปี

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ดอกสด ตำจิ้มน้ำพริก หรือแกงส้มรวมกับผักอื่นๆ ใส่ในน้ำเงี้ยว รับประทานกับขนมจีน ถ้ามีมากตากแห้งเก็บไว้ใช้ได้

รส หวาน ฝาดเย็น

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำ