


บุกคางคก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amorphophallus paeoniifolius* (Dennst.) Nicolson

ชื่อสามัญ Stanley's water-tub, Elephant yam

ชื่อพื้นเมือง บุกใหญ่, กะบึก (นครราชสีมา); บุก (ทั่วไป); บุกคูดก (ชลบุรี); เบี้ย, เบือ (แม่ฮ่องสอน); มันซูรัน (ภาคกลาง); หัวบุก (ปัตตานี); บุกคางคก (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); บุกหนาม, บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวงศ์ ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

หัว หัวทรงกลม สีน้ำตาล ผิวขรุขระ มีรากฝอยเล็กๆ อยู่โดยรอบ ออกหัวเดือนสิงหาคม – กันยายน

ใบ ใบเดี่ยว แผ่นกว้างคล้ายร่ม หยักเว้าเป็นสามแฉก ใบหยักลึกสุดเป็นแฉก ก้านใบกลมอวบน้ำลายสีเขียว

ดอก เป็นช่อดอกขนาดใหญ่ สีเหลือง ออกไม่พร้อมกันกับใบ ออกมาจากหัวใต้ดิน มีกาบรูปไข่หุ้มเป็นกรวยรองรับ ออกดอกเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

ผล ผลกลมรี สีเขียว เนื้อนุ่ม ผลแก่สีเหลืองส้ม

แหล่งที่พบ ป่าดิบแล้ง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดรำไร ขึ้นได้ดีในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ยอดอ่อน ฤดูฝน หัว ฤดูหนาว

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ลำต้นอ่อน ยอดอ่อน ต้มกับมะขามเปรี้ยว แล้วรินน้ำทิ้ง นำมาปรุงอาหาร เช่น แกงส้ม แกงกะทิ หัว ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแช่น้ำปูนใส แล้วนำมาทำอาหาร ต้ม แกง หรือทำขนมหวาน

รส ลำต้น ยอดอ่อน รสจืด หัว รสมัน

การขยายพันธุ์ เมล็ดและหัว