

เขลง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dialium cochinchinense* Pierre

ชื่อสามัญ Velvet tamarind

ชื่อพื้นเมือง นางดำ, หมากเค็ง (นครราชสีมา); กาหยี (มลายู – นราธิวาส);
เขลง (ภาคกลาง); ยี่ (ภูเก็ต); หยี (ภาคใต้)

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เขลงเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือก
ต้นสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ด เปลือกในสีแดง

ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 5-9 ใบ เรียงกึ่งตรงข้าม รูป
ไข่หรือรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็กสี
ขาว ออกดอกเดือนมิถุนายน – กันยายน

ผล ผลรูปรี ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนแยกจาก
เปลือก เมล็ดแข็ง กลมแบน ผิวมัน ออกผลเดือนกันยายน – ธันวาคม

แหล่งที่พบ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าคันทนา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบแสงแดดจัด ชอบขึ้นในที่ค่อนข้างชื้น

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ใบ ถูฝุ่น ผล ถูหนว

ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ยอดอ่อน ใบอ่อน นำไปปรุงรสให้มีรสเปรี้ยว หรือ
รับประทานเป็นผักสดกับน้ำพริก ลาบ ยำ ผลอ่อนนำมาต้มรับประทาน ผลแก่
รับประทานเนื้อ มีลักษณะคล้ายลูกหยี

รส ใบอ่อน รสเปรี้ยว เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวาน

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด